



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA



TRABAJO ACADÉMICO DE SUSTENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

CIRUGÍA DEL TERCER MOLAR INFERIOR IMPACTADO, EN PACIENTE DE 18 AÑOS DE EDAD, EN LA CIUDAD DEL CUSCO DEL AÑO 2017

PRESENTADO POR LA BACHILLER
ISABEL OCHOA CÁRDENA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
CIRUJANO DENTISTA

ASESOR:
MGT. CD. JOSÉ ANTONIO ALANYA RICALDE

CUSCO – PERÚ

2017



Título : CIRUGÍA DEL TERCER MOLAR INFERIOR IMPACTADO, EN PACIENTE DE 18 AÑOS DE EDAD, EN LA CIUDAD DEL CUSCO DEL AÑO 2017.

Autor : - Isabel Ochoa Cárdenas

Fecha : 30-10-2017

RESUMEN

La Extracción del tercer molar inferior retenido o impactado en posición Mesioangular se identifica radiográficamente la posición si el diente presenta impactación o retención con el diente vecino con una ligera inclinación en posición Mesioangular, estos dientes puede sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, provocando su retención parcial o total dentro de los procesos mandibulares.

La tercera molar inferior se presenta frecuentemente impactada después de la tercera molar superior. Se ha demostrado que ha mayor inclinación y es menor el espacio para la erupción de la tercera molar inferior, mayor es la posibilidad de impactación dando como consecuencia las complicación locales como pericoronaritis, quiste, tumores. Reabsorciones radiculares en las raíces del segunda molares mandibulares dolor y posible lesione del nervio dentario cuando se intenta extraer la tercera molar inferior.

En nuestro país en la práctica diaria los odontólogos ven casos donde frecuentemente se presentan impactaciones o retenciones de las tercera molar mandibular y en muchos casos existe la duda de tomar una determinación para la permanencia de las piezas dentarias con erupción interrumpida que aún no originan alguna sintomatología patológica y es necesario saber si existe una relación significativa entre los factores más predominantes que determinan la erupción de la tercera molar inferior. Por lo tanto se pretende sugerir que ante de la determinación de la permanencia o extracción de la tercera molar se tenga precauciones para siempre así poder prevenir las complicaciones por efecto de la impactación o retención.