



**UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**



**FACTORES ASOCIADOS A LA REINCIDENCIA DEL EMBARAZO EN  
ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO  
EN EL 2017.**

**BORRADOR DE TESIS PRESENTADO POR:**

ACHAHUI HUAMAN MARIA ESTEFANI

ANCA CERECEDA ESBRAILY MILAGROS

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE:**

LICENCIADA EN OBSTETRICIA

**ASESORA:**

DRA. OBST. GLADIS EDITH ROJAS SALAS.

**CUSCO – PERÚ**

**2017**



**Título :** FACTORES ASOCIADOS A LA REINCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO EN EL 2017.

**Autores :** - Maria Estefani Achahui Huaman  
- Esbraily Milagros Anca Cereceda

**Fecha :** 26-10-2017

## RESUMEN

La presente investigación intitulada “Factores Asociados a la Reincidencia del Embarazo en Adolescentes Atendidas en el Hospital Regional del Cusco en el 2017”, cuyo objetivo es analizar e identificar los factores asociados a la reincidencia del embarazo en la población adolescente. El presente estudio cuenta con un diseño de tipo no experimental, retrospectivo, de corte transversal, correlacional, cuantitativa. La población total estuvo conformada por 666 gestantes adolescentes, independientemente del modo de la forma de culminación del embarazo. La población de estudio estuvo conformada por 210 gestantes divididos en dos grupos: 105 madres adolescentes con embarazo reincidente (caso) y 105 con embarazo único (control). El instrumento fue una ficha de recolección de datos que fue aplicada a las Historias Clínicas y los resultados hallados fueron: que entre los factores socioeconómicos asociados a la reincidencia del embarazo en adolescentes el 81% son convivientes, el 84.8% no cuentan con una ocupación, el 52.4% pertenece al área rural, recibe apoyo económico de la pareja un 61.9% de los casos, el 87.6% de las adolescentes recibe apoyo económico de la familia. Entre los factores educativos encontramos que el 76,2% cuenta con una educación básica incompleta y que el 56,2% desertaron. En los Factores reproductivos: la edad de la menarquia predomina entre los 10 – 13 años, en un 81,9%, el inicio de las relaciones sexuales es entre 12-14 años, el 68,6% cuenta con más de dos parejas sexuales; el 81,9% de las adolescentes no tuvieron atenciones prenatales y no usan métodos anticonceptivos 85,7%. En los factores familiares; la reacción de aceptación de los padres y de la pareja ante el primer embarazo, el 83,8% mantuvo una relación mala con sus padres y el 69,5% con la pareja.

**Conclusión:** Los factores socio-económicos, educativos, reproductivos y familiares están asociados a la reincidencia del embarazo en la adolescencia.

**Palabras claves:** Embarazo Adolescente, Reincidencia de embarazo, factores asociados.



## SUMMARY

The present research entitled "Factors Associated with Recidivism of Pregnancy in Adolescents Attended in the Regional Hospital of Cusco in 2017", whose objective is to analyze and identify the factors associated with the recidivism of pregnancy in the adolescent population. The present study has a non-experimental, retrospective, cross-sectional, correlational, quantitative design. The total population consisted of 666 adolescent pregnant women, regardless of the mode of completion of pregnancy. The study population consisted of 210 pregnant women divided into two groups: 105 adolescent mothers with recurrent pregnancy (case) and 105 with single pregnancy (control). The instrument was a datasheet that was applied to the Clinical Histories and the results found were that among the socioeconomic factors associated with the recidivism of adolescent pregnancy, 81% are cohabiting, 84.8% do not have an occupation, 52.4% belong to the rural area, receives financial support from the couple 61.9% of the cases, 87.6% of the adolescents receive financial support from the family.

Among the educational factors we found that 76.2% had incomplete basic education and 56.2% deserted. In gynecological - obstetric factors: the age of menarche predominates between 10 - 13 years, in 81, 9%, the onset of sexual intercourse is between 12-14 years, 68.6% have more than two sexual partners; 81.9% of the adolescents did not have prenatal care and did not use contraceptive methods 85.7%. In the family factors, the acceptance reaction of the parents and the couple before the first pregnancy, 83.8% maintained a poor relationship with their parents and 69.5% with the couple.

Conclusion: Socioeconomic, educational, reproductive and family factors are associated with the recidivism of pregnancy in adolescence.

Key words: Adolescent Pregnancy, Recidivism of pregnancy, associated factors.