



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA



HÁBITOS DE HIGIENE BUCODENTAL Y LA
PERCEPCIÓN DE LA SALUD ORAL EN PACIENTES
EMBARAZADAS DEL CENTRO DE SALUD
BELENPAMPA - CUSCO, 2017

Presentado por la Bachiller:

Gutiérrez Castillo, Stefani Vanessa

Para optar al Título Profesional de
Cirujano Dentista

Asesor:

Mgt CD. José Antonio Alanya Ricalde

CUSCO - PERÚ

2017



Título : HÁBITOS DE HIGIENE BUCODENTAL Y LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD ORAL EN PACIENTES EMBARAZADAS DEL CENTRO DE SALUD BELENPAMPA - CUSCO, 2017.

Autor : - Stefani Vanessa Gutiérrez Castillo

Fecha : 02-10-2017

RESUMEN

El presente estudio fue de tipo correlacional, descriptivo teniendo como propósito evaluar los hábitos de higiene bucodental y su asociación con la percepción de la salud oral en pacientes embarazadas del centro de salud Belenpampa. Para realizar la medición se utilizó como instrumento un cuestionario con 26 preguntas, 14 de hábitos de higiene bucodental y 12 de percepción de la salud oral. Se relacionó con la edad, grado de instrucción, procedencia, ocupación denominados datos sociodemográficos y las variables entre sí. Se agrupó los resultados de la encuesta de hábitos de acuerdo al número de respuestas correctas (r.c.) en los siguientes intervalos: bueno (1-5 r.c.), regular (6-9 r.c.), y malo (10-14 r.c.) para percepción se construyeron niveles basados según la escala de (Rensis Likert) anexo n°2. Se encontró malos hábitos de higiene bucal como los más frecuentes con 68,7% (138 pacientes embarazadas), seguido de una regular higiene con 26,9% (54 pacientes embarazadas) y una buena higiene con 4,5% (9 pacientes embarazadas). Con relación a la percepción de la salud oral más frecuente fue bueno con 78,6% (158 pacientes embarazadas), seguido de regular con 20,4 (41 pacientes embarazadas) y malo con 1,0 (2 pacientes embarazadas). además se pudo observar que en la mayoría de este grupo prevalecía el grado de instrucción secundaria completa con 42,8% (86 pacientes embarazadas), de igual manera las edades más frecuentes fueron entre 19 a 25 años con 36,3% (73 pacientes embarazadas), con lugar de residencia urbana con 54,2% (109 pacientes embarazadas) y en su gran mayoría amas de casa con 42,8% (86 pacientes embarazadas) se estableció que no existe asociación entre hábitos de higiene bucodental y percepción de la salud oral ($p > 0.05$; 0,491).



SUMMARY

The present study was of a correlational, descriptive type with the purpose of evaluating the oral hygiene habits and its association with the perception of oral health in pregnant patients of the Belenpampa health center. To perform the measurement, a questionnaire was used as a questionnaire with 26 questions, 14 of oral hygiene habits and 12 of perception of oral health. It was related to the age, degree of education, origin, occupation denominated socio demografico data and the variables with each other. The results of the habits survey were grouped according to the number of correct answers (rc) in the following intervals: good (1-5 rc), regular (6-9 rc), and bad (10-14 rc) for perception levels based on the scale of (Rensis Likert) annex n ° 2 were constructed. It was found that the most frequent oral hygiene habits were poor with 68.7% (138 pregnant patients), followed by regular with 26.9% (54 pregnant patients) and good with 4.5% (9 pregnant patients). The most frequent oral health perception was 78.6% (158 pregnant patients), followed by regular with 20.4 (41 pregnant patients) and poor with 1.0 (2pregnant patients). it was observed that in the majority of this group the degree of complete secondary education prevailed with 42.8% (86 pregnant patients), and the most frequent ages were between 19 and 25 years old, with 36.3% (73 patients pregnant women), with 54.2% (109 pregnant patients) and 42.8% (86 pregnant patients) of urban housing, it was established that there is no association between ral hygiene habits and perception of oral health ($p > 0.05$, 0.491).