




UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**TASA DE CESÁREAS APLICANDO EL MODELO DE
CLASIFICACIÓN DE ROBSON EN EL HOSPITAL
NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DEL CUSCO,
2016 – 2017.**

Presentado por el Bachiller:

Gustavo Cusipaucar Uscamaita

Tesis para optar al Título Profesional
de Médico Cirujano

Asesor:

Dr. Rory Bustamante Ramirez

CUSCO – PERÚ

2018



Título : TASA DE CESÁREAS APLICANDO EL MODELO DE CLASIFICACIÓN DE ROBSON EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO DEL CUSCO, 2016 – 2017.

Autor : - Gustavo Cusipaucar Uscamaita

Fecha : 28-03-2018

RESUMEN

Objetivo: Determinar la tasa de cesáreas aplicando el modelo de clasificación de Robson en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco del Cusco, 2016 – 2017.

Métodos: El presente estudio es de tipo analítico, observacional, transversal, y retrospectivo. La población se conformo por 6319 partos que se realizaron en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco del Cusco en el periodo 2016 – 2017. Con una muestra de 2776 cesáreas.

Resultados: Las gestantes que terminaron en cesárea fueron 2776 representando una tasa de 43.9%, el mayor porcentaje de cesáreas fue 37.7% de la tasa general que se encontró en el grupo 3, en segundo lugar esta el grupo 1 con 24.28% y en tercer lugar el grupo 5 con 17%. Y con menor porcentaje fueron el grupo 2 con 0.7%, el grupos 4 con 1.6% y el grupo 6 con 1.8%, siendo los de menor porcentaje de la tasa general de cesáreas.

Conclusiones: En la clasificación de Robson los grupos 1, 3 y 5 fueron los que aportaron mas a la tasa general de cesáreas y los grupos que presentaron menor frecuencia fueron los grupos 2, 4 y 6,

Palabras claves: cesárea, tipo de parto, edad gestacional, presentación fetal.

SUMMARY

Objective: To determine the cesarean section rate by applying the Robson classification model at the Adolfo Guevara Velasco National Hospital in Cusco, 2016 - 2017.

Methods: The present study is analytical, observational, transversal, and retrospective. The population was satisfied by 6319 deliveries that were made in the Adolfo Guevara Velasco National Hospital of Cusco in the period 2016 - 2017. With a sample of 2776 caesarean sections.

Results: The pregnant women who finished in caesarean section were 2776 representing a rate of 43.9%, the highest percentage of cesareans was 37.7% of the general rate found in group 3, second is group 1 with 24.28% and third place group 5 with 17%. And with al ower percentage were group 2 with 0.7%, group 4 with 1.6% and group 6 with 1.8%, with the lowest percentage of the general cesarean rate.

Conclusions: In the Robson classification, groups 1, 3 and 5 were those that contributed most to the general cesarean rate and the groups that presented the least frequency were groups 2, 4 and 6,

Key words: cesarean section, type of delivery, gestational age, fetal presentation.