



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE LA PILDORA
ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA EN ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
ANTONIO LORENA, CUSCO 2017”

Presentado por la Bachiller

Santa Cruz Valdeiglesias Therenze

Veronica

Para optar al Título Profesional de
Licenciada en Enfermería

Asesor:

DR: LUIS A. CHIHUANTITO ABAL

Cusco – Perú
2018



Título : Nivel de conocimiento y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Antonio Lorena, Cusco 2017.

Autor : - Therenze Veronica Santa Cruz Valdeiglesias

Fecha : 16-03-2018

Resumen

El presente trabajo de investigación intitulado “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ANTONIO LORENA, CUSCO 2017”. Se formula el siguiente problema: ¿cuál es el nivel de conocimiento y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Antonio Lorena, Cusco; 2017? Se plantea como objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en estudiantes de enfermería del Instituto Superior Tecnológico Antonio Lorena, Cusco; 2017. La metodología es de tipo descriptivo, transversal, de naturaleza cuantitativa; como instrumento de investigación se utilizó el cuestionario. Según las categorías de estudio preestablecidas, se estableció las siguientes, características generales: edad oscila entre los 16 y los 25 años de edad, estado civil en su mayoría solteros, genero de los estudiantes la mayoría de sexo femenino y respecto a la religión en su gran mayoría son católicos. En cuanto al uso solo el 39,4% del total de estudiantes lo usan, 39,3% lo usan con una frecuencia de más de dos veces al año, 41.1% no requiere prescripción médica para su uso, 75% obtuvo la píldora en una farmacia ,39% fue recomendada por su amiga 38% lo uso entre las 24 a 72 horas postcoital 53,6%hace uso del levonorgestrel,16,07% presento sensibilidad mamaria y cansancio, 57% recibió información sobre la anticoncepción en el colegio, el 48%no hizo uso de ningún método regular después de la anticoncepción de emergencia. En cuanto al conocimiento solo el 1,4% tiene nivel de conocimiento bueno y 94,4% tiene conocimiento deficiente. Conclusión, los participantes llenaron una encuesta, quienes lo realizaron personalmente con un consentimiento de participar, de manera voluntaria en el presente trabajo de investigación

Palabras claves: Anticoncepción, Anticonceptivo oral de emergencia.



Abstract

This work of research entitled "level of knowledge and use of the contraceptive pill emergency in the INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ANTONIO LORENA nursing students, CUSCO 2017". Formulates the following problem: what is the level of knowledge and use of the emergency contraceptive pill in the Instituto Superior Tecnológico Antonio Lorena, Cusco; nursing students 2017? As objective: to determine the level of knowledge and use of the emergency contraceptive pill in the Instituto Superior Tecnológico Antonio Lorena, Cusco; nursing students 2017. The methodology is descriptive, transversal type, quantitative in nature; the questionnaire was used as a research tool. According to pre-established categories of study, was established the following general characteristics: age varies between 16 and 25 years of age, marital status mostly unmarried, gender the majority of female students and with regard to religion in the vast majority are Catholic. Use only 39.4% of the total number of students use it, 39.3% use it with a frequency of more than two times a year, 41.1% does not require a prescription for their use, 75% obtained the pill in a pharmacy, 39% was recommended by her friend 38% use it among the 24 to 72 postcoital 53.6% hours makes use of levonorgestrel, 16.07% breast present sensitivity and tiredness, 57% received information about contraception in school, 48% did not use any method regularly after emergency contraception, in terms of knowledge only 1.4% have level of knowledge good and 94.4% has poor knowledge. Conclusion, the participants filled a survey, which it personally with a consent to participate, on a voluntary basis in the present research

keywords: contraception, emergency oral contraception.