



# UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA



---

LACTANCIA MATERNA EN RELACIÓN A LOS PLANOS  
TERMINALES DE BAUME, EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS,  
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL  
REVOLUCIONARIA SANTA ROSA, CUSCO-2018.

---

TESIS PRESENTADA POR LA BACHILLER:  
NOHELI ARASELI GAMARRA MEJIA

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL  
DE CIRUJANO DENTISTA

ASESORA: CD. ESP. MARIA SOLEDAD  
MENDOZA ANTEZANA

CUSCO – PERU

2018



**Título :** Lactancia materna en relación a los planos terminales de baume, en niños de 3 a 5 años, de la institución Educativa Inicial Revolucionaria Santa Rosa, Cusco-2018.

**Autor :** - Noheli Araseli Gamarra Mejia

**Fecha :** 05-09-2018

### Resumen

La lactancia materna es el principal medio de alimentación del recién nacido, por lo que se le pueden atribuir ciertas características del desarrollo oclusal en los infantes, siendo los planos terminales de Baume presentes, una forma de predecir malposiciones dentales futuras. El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre la lactancia materna y los planos terminales de Baume, en niños de 3 a 5 años, de la I.E.I. Revolucionaria Santa Rosa, Cusco - 2018 La investigación fue correlacional, descriptiva y transversal. La muestra estuvo conformada por 80 niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Revolucionaria Santa Rosa. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la de un breve cuestionario con las madres de los menores, así como la observación y examen clínico de la cavidad oral de los niños, los mismos que han sido registrados en el instrumento de investigación. Los resultados fueron analizados mediante estadística descriptiva con análisis de frecuencia y Chi cuadrado. No se encontró relación de la lactancia materna y los planos terminales de Baume ( $p>0.05$ ). Se registró que el 80% de los niños fueron amamantados con leche materna exclusiva, por otro lado, el plano terminal de Baume más frecuente fue el escalón mesial con 58,8% y 62,5% en el lado derecho e izquierdo respectivamente.

Palabras claves: Lactancia materna, plano terminal, Baume, oclusión, maloclusión

### Summary

Breastfeeding is the main means of feeding the newborn, so that certain characteristics of occlusal development in infants can be attributed, with Baume's terminal planes present, a way of predicting future dental malpositions. The main objective of the present investigation was to determine the relationship between breastfeeding and the terminal plans of Baume, in children from 3 to 5 years old, from the Revolucionaria Santa Rosa children's garden, Cusco – 2018. The investigation was descriptive, correlational and transversal. The sample consisted of 80 children from 3 to 5 years of the Revolucionaria Santa Rosa children's garden. The technique used for the data collection was a brief questionnaire with the mothers of the children, as well as the observation and clinical examination of the oral cavity of the children, which have been recorded in the research instrument. The results were analyzed by descriptive statistics with frequency analysis and Chi square. No relationship was found between breastfeeding and Baume's terminal planes ( $p>0.05$ ). It was recorded that 80% of the children were breastfed with exclusive breast milk, on the other hand, the most frequent terminal plane of Baume was the mesial step with 58.8% and 62.5% on the right and left side respectively.

Keywords: Breastfeeding, terminal plan, Baume, occlusion, malocclusion