



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**“FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN
MUJERES ATENDIDAS DE ENERO 2016 A AGOSTO 2017
EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL
MISERICORDIOSO - QUILLABAMBA, 2017”**

Presentado por la Bachiller:

Aguilar Gil, Rosa Albina

Para optar al Título Profesional de
Licenciada en Enfermería

Asesora:

Dr. Edith Gudelia Pinto Pagaza

CUSCO – PERÚ

2018



RESUMEN

El presente trabajo de investigación intitulada “**FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO ECTÓPICO EN MUJERES ATENDIDAS DE ENERO 2016 A AGOSTO 2017 EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL MISERICORDIOSO - QUILLABAMBA, 2017**”, El objetivo fue Determinar los factores de riesgo del embarazo ectópico en mujeres atendidas de Enero 2016 a Agosto 2017 en el servicio de Ginecología del Hospital Misericordioso - Quillabamba, 2017; con diseño metodológico descriptivo de corte transversal y retrospectivo. Llegando a lo siguiente: Donde el 75% de las mujeres atendidas con Embarazo Ectópico tienen edades entre 19 a 35 años, 73.6% son convivientes, 62.5% tienen grado de instrucción secundaria, 50% provienen de Santa Ana, 55.6% son amas de casa. Sobre los Factores asociados al embarazo ectópico un 59.7% tuvieron cesaría, 61.1% tuvieron cirugía abdominal, 86.1% no tuvieron aspiración manual endouterina, 83.3% no se realizaron legrado uterino, 80.6% no tuvieron enfermedad pélvica inflamatoria, 86.1% no usan dispositivo intrauterino, 70.8% tienen edad de inicio de sus relaciones sexuales entre 16 a 20 años, 48.6% tienen 1 sola pareja, 90.3% no tuvieron antecedente de embarazo ectópico, 37.5% tienen de 1 a 2 parto.

Palabras Clave: *Embarazo ectópico.*

ABSTRACT

The present research work entitled “**RISK FACTORS OF ECTÓPIC PREGNANCY IN WOMEN ASSISTED FROM JANUARY 2016 TO AUGUST 2017 IN THE GYNECOLOGY SERVICE OF MISERICORDIOUS HOSPITAL - QUILLABAMBA, 2017**”, The objective was to determine the risk factors of ectopic pregnancy in women attended from January 2016 to August 2017 in the gynecology service of the Misericordioso Hospital - Quillabamba, 2017 with descriptive methodological design of cross section, retrospective. Arriving at the following: Where 75% of women treated with Ectopic Pregnancy are between 19 and 35 years old, 73.6% are cohabitants, 62.5% have a secondary education degree, 50% come from Santa Ana, and 55.6% are housewives. Regarding the factors associated with ectopic pregnancy, 59.7% had cesarean, 61.1% had abdominal surgery, 86.1% had no manual vacuum aspiration, 83.3% had no uterine curettage, 80.6% had no pelvic inflammatory disease, 86.1% did not use an IUD. , 70.8% have an age of onset of sexual intercourse between 16 to 20 years, 48.6% have 1 single partner, 90.3% had no history of ectopic pregnancy, and 37.5% have 1 to 2 births.

Palabras Clave: *Ectopic pregnancy.*