



Título : PERFIL MATERNO, OBSTÉTRICO Y FETAL DEL PARTO PRETERMINO EN EL HOSPITAL ANTONIO LORENA CUSCO 2013-2014.

Autor : - Katy Anaya Duran
- Gratiniana Paucar Camilla

Fecha : 2015

RESUMEN

“PERFIL MATERNO, OBSTÉTRICO Y FETAL DEL PARTO PRETÉRMINO EN EL HOSPITAL ANTONIO LORENA. CUSCO 2013- 2014”. Formulación del problema:

¿Cuál es el perfil materno, obstétrico y fetal del parto pretérmino en el Hospital Antonio Lorena. Cusco 2013 – 2014? ; Determinar el perfil materno, obstétrico y fetal del parto pretérmino en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, durante el año 2013 a 2014, estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, transversal. El perfil de la población de estudio se encuentran entre la edad materna adulta entre 19 a 34 años, grado de instrucción primaria, estado civil conviviente. Dentro de patologías maternas esta la anemia, ruptura prematura de membranas, HIE/preeclampsia, atención prenatal es insuficiente ,antecedente de aborto, antecedente de parto pretérmino, terminación de la gestación: parto vaginal, cesárea y el perfil fetal se presenta malformación congénita, reproducción asistida, el embarazo múltiple, muerte intrauterina.

Conclusiones: Los perfiles maternos, obstétricos y fetales fueron significativamente un factor predominante a la causa de parto pretermino.

PALABRAS CLAVE: Parto pretérmino, perfil materno, perfil obstétrico, perfil fetal.



SUMMARY

“MOTHER’S PROFILE, OBSTETRIC AND FETAL PRETERM DELIVERY HOSPITAL ANTONIO LORENA. CUSCO 2013- 2014”. Problem formulation:

What is the maternal, obstetric and fetal preterm delivery profile in the Antonio Lorena Hospital? Cusco 2013 - 2014? ; Determine maternal, obstetric and fetal preterm delivery profile in the Antonio Lorena Hospital of Cusco, during the year 2013-2014, retrospective, descriptive, transversal. The profile of the study population is among the adult maternal age between 19-34 years of elementary education degree, common law marriage. Within maternal pathologies that anemia , premature rupture of membranes, HIE / preeclampsia , antenatal care is inadequate , history of abortion , history of preterm birth , termination of pregnancy : vaginal delivery, cesarean section and fetal profile malformation , reproduction occurs assisted , multiple pregnancy , intrauterine death .

Conclusions: Maternal, obstetric and fetal profiles were significantly predominant factor to the cause of preterm delivery.

KEY WORDS: Preterm delivery, maternal profile, obstetric profile, fetal profile.