


UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**Universidad
Andina
del Cusco**



TESIS

RELACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y LAS
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS,
CLÍNICAS EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL
DE ATENCIÓN, CIUDAD DEL CUSCO, 2021

Presentado por

Tumi Alvarez, Keila Fatima

Para optar al Título Profesional de Médico
Cirujano

Asesor:

MC. Washington Claudio Villafuerte Jara

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la depresión y las características sociodemográficas, y clínicas en pacientes con tuberculosis en los establecimientos de salud del primer nivel de atención en la ciudad del Cusco, 2021.

Método: El presente estudio es descriptivo, observacional, transversal, correlacional, se desarrolló con una población de 70 pacientes con tuberculosis durante los meses de junio a julio, se aplicó como instrumento el test de PHQ-9, y para las características sociodemográficas y clínicas una ficha de recolección. El análisis de los resultados se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado, para lo cual se consideró un intervalo de confianza del 95% ($p < 0.05$)

Resultados: Del 60% de los pacientes que presentaron depresión, en un 25.7% fue moderado, 18.6% leve y 15.7% moderada-grave. En cuanto a las características sociodemográficas el ingreso económico familiar está relacionado con la depresión ($p = 0.001$), en relación a las características clínicas, la condición de ingreso al tratamiento antituberculoso está relacionado con la depresión ($p = 0.006$), del mismo modo, el tipo de tratamiento ($p = 0.009$) y las reacciones adversas ($p = 0.017$).

Conclusiones: Las características sociodemográficas, el ingreso económico familiar; características clínicas, la condición de ingreso al tratamiento, tipo de tratamiento, y las reacciones adversas están relacionados a la depresión en pacientes con tuberculosis.

Palabras clave: Depresión, tuberculosis, pacientes, establecimientos de salud.

ABSTRACT

The objective of this research work was to determine the relationship between depression and sociodemographic and clinical characteristics in patients with tuberculosis in health facilities of the first level of care in the city of Cusco, 2021.

Method: The present study is descriptive, observational, cross-sectional, correlational, it was developed with a population of 70 patients with tuberculosis during the months of June to July, the PHQ-9 test was applied as an instrument, and for the sociodemographic and clinical characteristics a collection token. The analysis of the results was performed using the Chi square test, for which a 95% confidence interval was considered ($p < 0.05$)

Results: Of the 60% of the patients who presented depression, in 25.7% it was moderate, 18.6% mild and 15.7% moderate-severe. Regarding the sociodemographic characteristics, family income is related to depression ($p = 0.001$), in relation to clinical characteristics, the condition of admission to anti-tuberculosis treatment is related to depression ($p = 0.006$), in the same way, the type of treatment ($p = 0.009$) and adverse reactions ($p = 0.017$).

Conclusions: Sociodemographic characteristics, family income; Clinical characteristics, the condition of admission to treatment, type of treatment, and adverse reactions are related to depression in patients with tuberculosis.

Keywords: Depression, tuberculosis, patients, health facilities.