



Título : COMPLICACIONES OBSTETRICAS DERIVADAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (Estudio referido a gestantes que acuden a la Clínica San José de la ciudad del Cusco en el periodo enero a junio de 2015).

Autor : - Zeida Mellado Ormachea.

Fecha : 01-12-2015

RESUMEN

Introducción: La presente investigación se realizó con el propósito de aportar conocimientos en el área de la salud sexual y reproductiva con respecto a las complicaciones obstétricas derivadas de casos de violencia familiar, estos resultados generarán nuevos estudios que busquen alternativas de solución frente a este gran problema de salud pública.

Objetivo: Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y las complicaciones obstétricas en gestantes que acuden a la clínica San José, Cusco; en el periodo de enero a junio del 2015.

Metodología: El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, su alcance es correlacional y el tipo de diseño es no experimental transversal.

Conclusiones: En la presente investigación, se determina que existe relación entre las variables de estudio: la violencia familiar y las complicaciones obstétricas, puesto que la existencia de violencia dentro del entorno familiar repercute negativamente en la salud de la gestante, generando la aparición de complicaciones obstétricas durante su embarazo, parto o puerperio.

La forma de violencia Familiar más frecuente es la violencia psicológica (57%), seguida de la combinación de la violencia psicológica y física (20,9%), luego de la violencia psicológica y sexual (9,3%), mientras que la combinación de las tres formas de violencia (7%) y finalmente la violencia sexual se presentó en un 5,8% de las participantes.

Las complicaciones obstétricas que presentaron las participantes fueron las siguientes: el 42,3% de las entrevistadas terminaron en parto prematuro, seguido de un 11,5% con recién nacidos de bajo peso al nacer, el 10,3% amenaza de aborto, 10,3% aborto, 10,3% hiperémesis gravídica, el 5,1%



ruptura prematura de membranas, 3,8% pre eclampsia, 2,6% óbito fetal, 2,6% amenaza de parto prematuro y finalmente un 1,3% infecciones.

De las pacientes que presentaron complicaciones obstétricas derivadas de la violencia familiar, se puede concluir lo siguiente: Que el 69,8 % de las gestantes atendidas en la Clínica San José del Cusco, manifestaron ser víctimas de violencia familiar, y de acuerdo a la forma de violencia se obtuvieron los siguientes resultados:

Como resultado de la violencia psicológica: el 6,3% tuvo amenaza de aborto (AA); el 12,5% terminó en aborto; el 43,8% parto prematuro (PP); el 6,3% ruptura prematura de membranas (RPM) e hiperémesis gravídica respectivamente; el 9,4% hipertensión inducida por el embarazo (HIE); el 3,1% óbito fetal (OF) y el 12,5% bajo peso al nacer (BPN).

Mientras que las gestantes que fueron víctimas de violencia sexual; el 75,0% terminó en parto prematuro y el 25,0% de recién nacidos tuvieron bajo peso al nacer.

De la combinación de formas de violencia: las gestantes que fueron víctimas de violencia físico y psicológico; el 28,6% presentaron AA; el 21,4% terminó en aborto; el 7,1% APP; el 14,3% PP e hiperémesis gravídica respectivamente; el 7,1% OF y BPN respectivamente.

Mientras que las gestantes que fueron víctimas de violencia psicológica y sexual; el 20,0% tuvieron como diagnóstico AA, PP, RPM, hiperémesis gravídica y BPN respectivamente.

Finalmente las gestantes que fueron víctimas de la combinación de las tres formas de violencia: físico, psicológica y sexual; el 13,3% tuvo AA y aborto respectivamente; el 3,3% APP, el 33,3% PP; el 6,7% RPM; el 10,0% hiperémesis gravídica; el 5,0% HIE; el 3,3% óbito fetal y el 11,7% BPN.

Luego de aplicar la prueba chi-cuadrado, se obtuvo como resultado $p=0,00$. Con lo que se puede concluir a un 95% de confianza que existe relación entre



las variables: violencia familiar y complicaciones obstétricas, por lo que se ha comprobado la hipótesis planteada, estableciendo que existen complicaciones obstétricas que se han derivado de casos de violencia familiar en gestantes que acuden a la Clínica San José, Cusco, en el periodo de enero a junio del 2015.

Palabras clave: Complicaciones obstétricas, violencia familiar y gestante.



ABSTRACT

Introduction: This research was conducted in order to provide expertise in the area of sexual and reproductive health with regard to obstetric complications of domestic violence cases, these results will generate new studies seeking alternative solution to this big problem Public health.

Objective: To determine the relationship between family violence and obstetric complications in pregnant women who come to the clinic San José, Cusco; in the period from January to June 2015.

Methodology: The focus of research is quantitative, its scope is correlational and type of design is not experimental cross.

Conclusions: In the present investigation, it is determined that there is a relationship between the study variables: family violence and obstetric complications, since the existence of violence within the family negatively impacts the health of pregnant women, creating the appearance of complications midwives during pregnancy, delivery or postpartum.

The most common form of family violence is psychological violence (57%), followed by the combination of psychological and physical violence (20.9%), then psychological and sexual violence (9.3%), while the combination of the three forms of violence (7%) and finally the sexual violence occurred in 5.8% of participants.

Obstetric complications that presented the participants were as follows: 42.3% of respondents ended in premature birth, followed by 11.5% with low birth weight at birth, 10.3% threatened abortion 10,3% abortion, hyperemesis gravidarum 10.3%, 5.1% premature rupture of membranes, 3.8% pre eclampsia, stillbirth 2.6%, 2.6% preterm labor and finally 1.3 % infection.

Of the patients who had obstetric complications of family violence, we can conclude the following: 69.8% of pregnant women treated at the San Jose Clinic Cusco, they claimed to be victims of domestic violence, according to the form violence the following results were obtained:

As a result of psicol or logical violence: 6.3% had threatened abortion (AA); or 12.5% ended in abortion; 43.8% preterm delivery (PP); 6, 3%



premature rupture of membranes (PROM) and hyperemesis gravidarum respectively; 9.4% hypertension or pregnancy-induced (HPI); 3.1% orfetal habit (OF) and 12.5% low birth weight (LBW).

While pregnant women who were victims of sexual violence; or 75.0% ended in preterm delivery and 25.0% of newborn had low birth weight.

For the combination of forms of violence: the pregnant women who were victims of violence physical and psychological; 28.6% had AA; or 21.4% ended in abortion; APP 7.1%; 14.3% PP and hyper- and gravemesis indicates respectively; and 7.1% OF BPN respectively.

While pregnant women who were victims of psychological and sexual violence; 20.0% had Diagnose or AA, PP, RPM, hyperemesis gravidarum and BPN respectively.

Finally pregnant women who were victims of the combination of the three forms of violence: physical, logical and psychological or sexual; 13.3% had AA and abortion respectively; APP 3.3%, 33.3% PP; RPM 6.7%; 10.0% hyperemesis gravidarum; HIE 5.0%; 3.3% or fetal habit and 11.7% BPN.

After applying the chi-square test it was obtained as a result $p = 0.00$. Thus it can be concluded to a 95% confidence that there relationship or n between the variables: family violence and obstetric complications, so it has proven the hypothesis, stating that there n complications Obstetric that They have been derived from family violence in pregnant women attending the Clínica San José, Cusco, in the period from January to June 2015.

Keywords: Obstetric complications, family violence and pregnant.