



Título : PREVALENCIA DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES SEGÚN EL ÍNDICE ANAMNÉSICO SIMPLIFICADO DE FONSECA EN ALUMNOS DE 18 A 29 AÑOS DE EDAD DE LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA LUIS VALLEJO SANTONI DEL CUSCO, SEMESTRE 2015-III.

Autor : - Frank Jower Mendoza Sarmiento

Fecha : 2016

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo ver la Prevalencia de Trastornos Temporomandibulares según el Índice Anamnésico Simplificado de Fonseca en alumnos de 18 a 29 años de edad de la Clínica Estomatológica Luis Vallejo Santoni del Cusco.

Se realizó con una población integrada por 136 alumnos de la Clínica Estomatológica Luis vallejos Santoni, inscritos en el semestre académico 2015-III. El estudio según el tipo es de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. El diseño de la investigación es de temporalidad prospectiva de campo y transversal.

Se utilizó como instrumento el Índice Anamnésico simplificado de Fonseca; es uno de los instrumentos disponibles para la caracterización de los síntomas de TTM y fue diseñado para clasificar a los pacientes de acuerdo a las categorías de severidad de TTM, demostrando una confiabilidad del 95%, cuando se le comparó al Índice Anamnésico de Helkimo. El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa SPSS 21.

Según los resultados se encontró una prevalencia TTM. Siendo el sexo masculino el más afectado con un 58.7% a diferencia del sexo femenino con (41,3%) y en cuanto a individuos con grado de severidad se mostró, leve (24,3%), moderada (39,0%), severa (8,8%) y sin TTM (27.9%).

Palabras claves: articulación temporomandibular, alteraciones temporomandibulares, disfunción temporomandibular, severidad, trastorno temporomandibular.



ABSTRACT

The present work of investigation had like aim see the prevalence of disorders temporomandibulares according to the Index Anamnésico Simplified of Fonseca in students of 18 to 29 years of age of the Clinic Estomatológica Luis Vallejo Santoni of the Cusco.

It realized with an integrated population by 136 students of the Clinic Estomatológica Luis Vallejo Santoni, inscribed in the academic semester 2015-III. The study according to the type is of quantitative approach and of descriptive level. The design of the investigation is of temporality prospective of field and transversal.

Used like instrument the Index Anamnésico simplified of Fonseca; it is one of the available instruments for the characterization of the symptoms of TTM and was designed to classify to the patients of agreement to the categories of severity of TTM, showing a reliability of 95%, when it compared him to the Index Anamnésico of Helkimo. The processing of data realized using the program SPSS 21.

According to the results found prevalence TTM. Being the masculine sex the most affected with 58.7% unlike the feminine sex with (41,3%) and regarding individuals with degree of severity showed, slight (24,3%), moderate (39,0%), severe (8,8%) and without TTM (27.9%).

Keyword: Articulation temporomandibular, alterations temporomandibulares, dysfunction temporomandibular, severity, disorder temporomandibular.