



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA



TESIS

**RELACIÓN DE LA LACTANCIA Y PLANOS TERMINALES EN NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO INICIAL SANTA INÉS DISTRITO DEL
CUSCO AÑO 2023.**

Línea de Investigación: Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades Estomatológicas.

Presentado por el bachiller:

CHRISTIAN FABRICIO FARFAN SALAZAR

ORCID:0000-0002-7080-3939

Para optar al Título Profesional de cirujano dentista

Asesor: Alhi Jordán Herrera Osorio

ORCID:0000-0001-5286-2700

Coasesor: Milagros Natalia Yáñez Herrera

ORCID: 0000-0002-7080-3939

CUSCO-2023



TESIS

por CHRISTIAN FABRICIO FARFAN SALAZAR

Fecha de entrega: 30-oct-2023 12:09p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2212149437

Nombre del archivo: TESIS_levantada_las_observaciones.pdf (1.23M)

Total de palabras: 14985

Total de caracteres: 81985



TESIS

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

6%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

ENCONTRAR COINCIDENCIAS CON TODAS LAS FUENTES (SOLO SE IMPRIMIRÁ LA FUENTE SELECCIONADA)

2%

★ distancia.udh.edu.pe

Fuente de Internet

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 15 words

Excluir bibliografía

Apagado



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: **Cristhian Farfan Salazar**
Título del ejercicio: **REVISION**
Título de la entrega: **TESIS**
Nombre del archivo: **TESIS_CHRIS_FINAL_SET_23.pdf**
Tamaño del archivo: **1.61M**
Total páginas: **76**
Total de palabras: **14,142**
Total de caracteres: **76,831**
Fecha de entrega: **18-sept.-2023 08:23a. m. (UTC-0500)**
Identificador de la entre... **2169558733**





La presente investigación denominada relación de la lactancia y planos terminales en niños de 3 a 5 años en el centro educativo inicial Santa Inés, distrito del Cusco año 2023, tuvo como objetivo establecer la relación de la lactancia y los planos terminales en niños de 3 a 5 años del centro educativo inicial Santa Inés, distrito del Cusco, 2023. La metodología contempló un estudio no experimental de corte transversal y correlacional, para todo ello se emplearon dos instrumentos una fue la ficha clínica en la que se observaron los planos terminales y la otra un cuestionario dirigido a las madres para saber sobre la lactancia proporcionada. Los resultados demostraron que el tipo de lactancia más frecuente recibido por los niños de 3-5 años de la institución inicial Santa Inés del Cusco fue la lactancia materna exclusiva. (64.1%), que el tipo de plano terminal más frecuente fue el plano terminal mesial (85.9%). Se identificó que no existe una relación entre el plano terminal y la lactancia materna según edad y sexo ($p=0.518$ y $p=0.832$) y si existe una relación entre el plano terminal y la lactancia materna según el tiempo de amamantamiento ($p=0.412$). Se concluye que si existe una relación significativa entre el tipo de lactancia y el plano terminal ($p=0.0009$)

Palabras claves: plano terminal, lactancia, amamantamiento



ABSTRACT

The present investigation called the relationship between breastfeeding and terminal plans in children from 3 to 5 years old in centro educativo inicial Santa, district of Cusco, year 2023, aimed to establish the relationship between breastfeeding and terminal plans in children from 3 to 5 years old years of the centro educativo inicial Santa Inés, district of Cusco, 2023. The methodology contemplates a non-experimental cross-sectional and correlational study, for all of this, two instruments were used, one was the clinical record in which the terminal planes were observed and the other a questionnaire aimed at mothers to find out about the breastfeeding provided. The results demonstrated that the most frequent type of breastfeeding received by children aged 3-5 years from the centro educativo inicial Santa Inés del Cusco was exclusive breastfeeding. (64.1%), that the most frequent type of terminal plane was the mesial terminal plane (85.9%). It was identified that there is no relationship between the terminal plane and breastfeeding according to age and sex ($p=0.518$ and $p=0.832$) and there is a relationship between the terminal plane and breastfeeding according to the duration of breastfeeding ($p= p=0.412$). It is concluded that there is a significant relationship between the type of breastfeeding and the terminal plane ($p=0.09$).

Keywords: terminal plane, lactation, breastfeeding