



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



DEPRESIÓN POSTPARTO EN PUERPERAS MEDIATAS
ATENDIDAS EN LOS HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD
CUSCO, 2016

TESIS PRESENTADO POR:

CARDENAS INGLES GINA MERLY

YUPANQUI HUILLCA AMBHAR ALEXANDRA

PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADAS EN OBSTETRICIA

ASESORA:

DRA. OBST. GLADIS EDITH ROJAS SALAS

CUSCO – PERÚ
2017



Título : DEPRESIÓN POSTPARTO EN PUERPERAS MEDIATAS ATENDIDAS EN LOS HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD CUSCO, 2016.

Autores : - Gina Merly Cardenas Ingles
- Ambhar Alexandra Yupanqui Huillca

Fecha : 12-06-2017

RESUMEN

Depresión postparto en puérperas mediatas atendidas en los hospitales del ministerio de salud cusco, 2016, estudio cuyo objetivo es analizar la relación entre la depresión postparto y las características sociodemográficas, obstétricas y clínicas de la gestación en la puérperas mediatas atendidas, de diseño no experimental, correlacional, de corte longitudinal, cuantitativa, donde la población fueron puérperas mediatas que acudieron a los hospitales del Ministerio de Salud de la Ciudad del Cusco, a sus atenciones en consultorio de postnatal, planificación familiar, ginecología y consultorios de neonatología, considerando un total de 214 (107 puérperas de cada hospital). Resultados: La prevalencia es de 45%, los niveles de depresión fueron 26% depresión moderada, 15% depresión ligera y el 4% con depresión severa; las características sociodemográficas son edades extremas, educación básica, con pareja, cuentan con seguro de salud; las características obstétricas son gestación planificada, con atenciones prenatales tiene un hijo y más de un hijo; las manifestaciones clínicas son edad gestacional a término, la complicación durante la etapa de la gestación estuvo presente y la complicación en el parto no estuvo presente, la terminación de la gestación se presenta como eutócico evidenciando que existe depresión severa postparto, el estado del recién nacido fue bueno.

Palabras clave: depresión postparto, puérperas mediatas



ABSTRACT

Postpartum depression in postpartum mothers attended at the hospitals of the Ministry of Health Cusco, 2016, a study whose objective is to analyze the relationship between postpartum depression and the sociodemographic, obstetrical and clinical characteristics of gestation in the postpartum women, Experimental, correlational, longitudinal, quantitative study, where the population were postpartum mothers who attended the hospitals of the Ministry of Health of the City of Cusco, to their care in postnatal clinic, family planning, gynecology and neonatology clinics, Total of 214 (107 puerperas from each hospital).

RESULTS: Prevalence was 45%, depression levels were 26% moderate depression, 15% mild depression, and 4% with severe depression; The sociodemographic characteristics are extreme ages, basic education, with partner, they have health insurance; Obstetric characteristics are planned gestation, with prenatal care has one child and more than one child; The clinical manifestations are term gestational age, the complication during the gestation stage was present and the complication in the delivery was not present, the termination of gestation is presented as euthymic evidencing that there is severe postpartum depression, the state of the newborn it was good.

Keywords: postpartum depression, puerperal mediates