



Universidad Andina del Cusco
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional de Obstetricia



**Complicaciones materno perinatales del embarazo doble en pacientes
atendidas en el Hospital Antonio Lorena Cusco, 2017.**

Presentado por:

Chaparro Mercado Carmen

Layme Arredondo Katherine Ursula

Título a optar el título de:

Licenciadas en Obstetricia

Asesora:

Dra. Obst. Alicia E. De La Cruz Galarza

Cusco – Perú

2018



Título : Complicaciones materno perinatales del embarazo doble en pacientes atendidas en el Hospital Antonio Lorena Cusco, 2017.

Autor : - Carmen Chaparro Mercado
- Katherine Ursula Layme Arredondo

Fecha : 06-06-2018

Resumen

Complicaciones materno perinatales del embarazo doble en pacientes atendidas en el Hospital Antonio Lorena Cusco, 2017, estudio cuyo objetivo fue determinar las complicaciones materno perinatales del embarazo doble, investigación descriptiva, de corte transversal, cuantitativa, con diseño no experimental, retrospectivo. Resultados: la incidencia del embarazo doble en pacientes atendidas en el Hospital Antonio Lorena Cusco, durante el año 2017 es de 1.3%; las complicaciones maternas durante la gestación en embarazo doble en pacientes atendidas en el Hospital Antonio Lorena Cusco, durante el año 2017 fue de trastornos hipertensivos en un 40%, amenaza de parto pre término 26%, ruptura prematura de membranas 20%, 10% hemorragia y trastorno de líquido amniótico, 8% sufrimiento fetal agudo y 4% diabetes, las complicaciones en el intraoperatorio están presentes en el 8% representando el 100% de las cuales el 88% presento hipotonía uterina, 8% presento eclampsia y el 4% presento atonía uterina, en el post operatorio se evidencio con el 30% representando el 100% de los cuales el 50% fue por presentar anemia post operatorio, en el 32% infección de herida operatoria y en el 18% hemoperitoneo, siendo el 70% de gestantes que no presentaron ninguna complicación post operatoria; las complicaciones perinatales son APGAR menor de 7 en el 4%, el bajo peso 42% y la edad gestacional menor de 37 semanas en el 56%; patologías como ictericia 12%, retardo de crecimiento intrauterino 4%; la mortalidad perinatal fue de 6%. Conclusiones: la incidencia del embarazo doble es 1.3%, la complicación materna más frecuente es trastorno hipertensivo y perinatal es edad gestacional menor de 37 semanas.

Palabras clave: embarazo doble, incidencia, complicaciones materna y perinatales



Abstract

Maternal and perinatal complications of double pregnancy in patients seen at the Antonio Lorena Hospital in Cusco, 2017, whose objective was to determine the maternal and perinatal complications of double pregnancy, descriptive, cross-sectional, quantitative research, with a non-experimental, retrospective design. Results: the incidence of double pregnancy in patients treated at the Antonio Lorena Hospital in Cusco, during the year 2017 is 1.3%; maternal complications were hypertensive disorders 30%, threatened premature birth 14%, premature rupture of membranes 12%, 10% hemorrhage and amniotic fluid disorder, 8% acute fetal distress and 4% diabetes, intraoperatively 4% presented hypotonia uterine, 2% eclampsia and 2% uterine atony; in the operating room, 24% presented post-operative anemia, 4% operative wound infection and 2% hemoperitoneum; the PERGAR perinatal complications younger than 7 in 4%, the low weight 42% and the gestational age less than 37 weeks in 56%; pathologies such as jaundice 12%, intrauterine growth retardation 4%; perinatal mortality was 6%. Conclusions: the incidence of pregnancy is 1.3%, the most common maternal complication is hypertensive disorder and gestational age less than 37 weeks.

Keywords: double pregnancy, incidence, maternal and perinatal complications