



Universidad Andina del Cusco
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional de Obstetricia



Factores que influyen en el reinicio de la actividad sexual postparto en usuarias del Centro de Salud de Wanchaq Cusco, 2018.

Tesis presentada por:

Bch. Ccoyuri Oca Cintia

Bch. Soto Flores Nancy Yolanda

Para optar al Título Profesional de:

Licenciadas en Obstetricia

Asesora:

Dra. Obst. Gladys Edith Rojas Salas

Cusco – Perú

2019



Resumen

La presente investigación intitulada “Factores que influyen en el reinicio de la actividad sexual postparto en usuarias del Centro de Salud de Wanchaq Cusco, 2018”, tiene como objetivo identificar los factores que influyen en el reinicio de la actividad sexual postparto donde la metodología es investigación analítica, correlacional con diseño no experimental, de casos y controles, enfoque cuantitativo y prospectivo. Resultados: No hay factores biológicos que influyen en el reinicio de la actividad sexual postparto en usuarias del Centro de Salud de Wanchaq Cusco durante el año 2018. Los factores psicológicos que influyen en el reinicio de la actividad sexual postparto en usuarias del Centro de Salud de Wanchaq Cusco durante el año 2018 son temor a un nuevo embarazo, temor a experimentar dolor y sentimiento de verse menos atractiva. Los factores sociales que influyen en el reinicio de la actividad sexual postparto en usuarias del Centro de Salud de Wanchaq Cusco durante el año 2018 son edad, estado civil y ocupación. Conclusiones: Los factores que influyen en el reinicio de la actividad sexual son psicológicos como el temor y sociales como edad, estado civil y ocupación.

Palabras clave: Factores influyentes, reinicio de actividad sexual, postparto



Abstract

This research entitled Factors that influence the resumption of postpartum sexual activity in users of the Wanchaq Cusco Health Center, 2018, aims to identify the factors that influence the resumption of postpartum sexual activity where the methodology is analytical research, correlational with non-experimental design, of cases and controls, quantitative and prospective approach. Results: The social factors that influence the resumption of postpartum sexual activity in users of the Wanchaq Cusco Health Center during 2018 are age, marital status and occupation. There are no biological factors that influence the resumption of postpartum sexual activity in users of the Wanchaq Cusco Health Center during 2018. The psychological factors that influence the resumption of postpartum sexual activity in users of the Wanchaq Health Center Cusco during 2018 they are afraid of a new pregnancy, fear of experiencing pain and feeling less attractive. Conclusion: The factors that influence the resumption of sexual activity after childbirth are social and psychological.

Key words: Influential factors, restart of sexual activity, postpartum