



**Universidad Andina del Cusco
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Profesional de Obstetricia**



**Nivel de cumplimiento sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina -
Norma Técnica N° 652-2016/MINSA en hospitales del Ministerio de Salud
Cusco, 2017.**

Presentado por:

Acruta Pauccar Rosmery

Para optar al título profesional de:

Licenciada en obstetricia

Asesora:

Dra. Obst. Gladis Edith Rojas Salas

Cusco – Perú

2019



Resumen

Nivel de cumplimiento sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina - Norma Técnica N° 652-2016/MINSA en hospitales del Ministerio de Salud Cusco, 2017.

Estudio cuyo objetivo fue identificar el nivel de cumplimiento en los profesionales de salud sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina.

Metodología: Investigación descriptiva, cuantitativa, retrospectiva, de diseño no experimental, de corte transversal.

Resultados: Las características generales de pacientes que se realizaron anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina en los Hospitales del Ministerio de Salud Cusco, 2017 fueron edad mayor de 35 años, grado de instrucción secundaria, estado civil conviviente, amas de casa, procedencia urbana, multíparas; el nivel de cumplimiento en los profesionales de salud respecto a la orientación/consejería en salud sexual y reproductiva fue de cumplimiento de la primera sesión, el cumplimiento en los profesionales de salud respecto a las consideraciones previas a la intervención se observó que la solicitud voluntaria al método es un 90%, la usuaria es mayor de edad 100%, el número de hijos deseados es 100%, 78% cumplió con tener dos sesiones de orientación consejería previa, 72% tiene firma de solicitud de intervención, 82% registra evaluación médica completa, la valoración del riesgo quirúrgico fue en el 80%, valoración del riesgo anestésico 100%, intervino un gineco obstetra con anestesiólogo en el 100% y fue realizado en un establecimiento calificado como Puntos de Entrega de Servicios 100%; el cumplimiento en los profesionales de salud respecto a las disposiciones para el período post operatorio en la anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina es de 68% la paciente estuvo en observación mínimo de 24 horas, 60% no entregó información por escrito sobre cuidados, el 100% tuvo provisión de analgésico e indicación de uso, 80% no tuvo control en el 3er día postoperatorio, 68% no cumplió con el control al 7mo día postoperatorio.



Abstrac

Compliance level on female voluntary surgical contraception - Technical Standard No. 652-2016 / MINSA in hospitals of the Ministry of Health Cusco, 2017.

Study whose objective was to identify the level of compliance in female health professionals regarding voluntary female surgical contraception.

Methodology: Descriptive, quantitative, retrospective, non-experimental design, cross-sectional research.

Results: The general characteristics of patients who underwent voluntary female surgical contraception at the Hospitals of the Ministry of Health Cusco, 2017 were age over 35 years, degree of secondary education, cohabiting marital status, housewives, urban origin, multiparous; the level of compliance in health professionals regarding sexual / reproductive health counseling / counseling was significant, compliance in health professionals regarding pre-intervention considerations, it was observed that the voluntary request to the method is 90% , the user is 100% of age, the number of children desired is 100%, 78% complied with having two orientation sessions prior counseling, 72% have an intervention request signature, 82% record a complete medical evaluation, the assessment of Surgical risk was 80%, 100% anesthetic risk assessment, an obstetrician gynecologist with an anesthesiologist intervened in 100% and was performed in a facility rated 100% PES; compliance in health professionals regarding the provisions for the post-operative period in female voluntary surgical contraception is 68%, the patient was under observation for at least 24 hours, 60% did not provide written information about care, 100% had provision of analgesic and indication of use, 80% had no control on the 3rd postoperative day, 68% did not comply with the control on the 7th postoperative day.

Keywords: level of compliance, female voluntary contraception, technical standard